

1- Corresponde à origem da corrente bioética do "principalismo":

- | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| a) vigilância. | <input checked="" type="checkbox"/> | F | <input type="checkbox"/> | V |
| b) atualização. | <input checked="" type="checkbox"/> | F | <input type="checkbox"/> | V |
| c) beneficência. | <input type="checkbox"/> | F | <input checked="" type="checkbox"/> | V |
| d) justiça. | <input type="checkbox"/> | F | <input checked="" type="checkbox"/> | V |
| e) autonomia. | <input type="checkbox"/> | F | <input checked="" type="checkbox"/> | V |

2- Sobre o estatuto da SBA:

- | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| a) um médico anesthesiologista formado em uma residência médica que não tem credenciamento como Centro de Ensino e Treinamento da SBA foi aprovado no concurso para obtenção do Título de Especialista em Anestesiologia (TEA). Ele será admitido na SBA como membro ativo. | <input type="checkbox"/> | F | <input checked="" type="checkbox"/> | V |
| b) um membro da SBA que deixa de ser membro da Sociedade Regional deixará de fazer parte da SBA. | <input type="checkbox"/> | F | <input checked="" type="checkbox"/> | V |
| c) a escolha dos componentes da Comissão de Ensino e Treinamento é feita pelos membros da diretoria eleitos no ano anterior. | <input checked="" type="checkbox"/> | F | <input type="checkbox"/> | V |
| d) somente os membros ativos e remidos da SBA tem o direito de prestar concurso para obtenção do Título Superior em Anestesiologia. | <input type="checkbox"/> | F | <input checked="" type="checkbox"/> | V |
| e) a Diretoria é o seu órgão executivo e todos os seus membros devem ser portadores do Título Superior em Anestesiologia. | <input type="checkbox"/> | F | <input checked="" type="checkbox"/> | V |

3- Em relação aos riscos ocupacionais em anestesiologia:

- | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| a) a privação do sono é o principal determinante do estresse ocupacional. | <input type="checkbox"/> | F | <input checked="" type="checkbox"/> | V |
| b) segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, não é recomendada a vacina para hepatite B de rotina para todos os profissionais de saúde. | <input checked="" type="checkbox"/> | F | <input type="checkbox"/> | V |
| c) é indicada a quimioprofilaxia com antirretrovirais em todos os casos de acidentes com risco de transmissão do HIV e ela deve ser iniciada após 24 horas da exposição. | <input checked="" type="checkbox"/> | F | <input type="checkbox"/> | V |
| d) o patógeno mais frequentemente envolvido na transmissão por exposição acidental é o vírus da hepatite B. | <input type="checkbox"/> | F | <input checked="" type="checkbox"/> | V |
| e) os níveis máximos de ruídos permitidos em ambientes hospitalares são de 45 decibéis, sendo aceitos níveis de 145 decibéis por mínimos períodos de tempo. | <input type="checkbox"/> | F | <input checked="" type="checkbox"/> | V |

4- Mulher de 75 anos, 88kg e 1,62m, será submetida à artroplastia total de quadril à esquerda. Hipertensa e diabética com passado de internação pela Covid-19 há 4 meses, vem em uso regular de losartana, metformina, AAS e dabigatrana. Na avaliação pré-anestésica, relata capacidade funcional acima de 4 METs e, ao exame físico, apresenta pressão arterial de 160x95mmHg e frequência cardíaca de 75 batimentos por minuto. Nessa situação:

- | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| a) a losartana deve ser suspensa nas 24 horas que antecedem a cirurgia. | <input type="checkbox"/> | F | <input checked="" type="checkbox"/> | V |
| b) deve-se solicitar o ecocardiograma transtorácico para avaliação de função ventricular esquerda. | <input checked="" type="checkbox"/> | F | <input type="checkbox"/> | V |
| c) a paciente apresenta alto risco segundo o Índice de Risco Cardíaco Revisado. | <input checked="" type="checkbox"/> | F | <input type="checkbox"/> | V |
| d) tais níveis tensionais contra-indicam a realização do procedimento eletivo proposto. | <input checked="" type="checkbox"/> | F | <input type="checkbox"/> | V |
| e) o tempo de suspensão da dabigatrana está condicionado à função renal da paciente. | <input type="checkbox"/> | F | <input checked="" type="checkbox"/> | V |

5- Constitui fator de risco independente para dificuldade de ventilação sob máscara facial:

- | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| a) sexo masculino. | <input checked="" type="checkbox"/> | F | <input type="checkbox"/> | V |
| b) presença de barba. | <input type="checkbox"/> | F | <input checked="" type="checkbox"/> | V |
| c) ausência de dentes. | <input type="checkbox"/> | F | <input checked="" type="checkbox"/> | V |
| d) índice de massa corporal maior que 26kg/m ² . | <input type="checkbox"/> | F | <input checked="" type="checkbox"/> | V |
| e) idade superior a 45 anos. | <input checked="" type="checkbox"/> | F | <input type="checkbox"/> | V |