

1 - Homem, 56 anos, 82Kg, 171cm, para cirurgia eletiva de herniorrafia inguinal videolaparoscópica sob anestesia geral. Durante a intubação orotraqueal houve lesão dentária. Nessa situação se o paciente reclamar em juízo:

- a) a lesão dentária pode ser considerada erro médico. ☐ F ☒ V
- b) a verificação de culpa pode ser imputada como negligência e imprudência. ☒ F ☐ V
- c) o anestesista pode ser responsabilizado civil, criminal e ético-profissionalmente. ☐ F ☒ V
- d) se utilizar máscara laríngea ao invés de tubo endotraqueal não será passível de processo. ☒ F ☐ V
- e) o anestesista deve guardar sempre a proporção ou a relação direta entre a anestesia e a importância da operação. ☐ F ☒ V

2 - Quanto à organização da SBA:

- a) Alteração no Estatuto da SBA deverá ser realizada na Assembleia de Representantes. ☒ F ☐ V
- b) Deixará de ser membro da SBA todo indivíduo que deixar de ser membro da Regional da SBA. ☐ F ☒ V
- c) A aprovação de contas anuais da SBA deve acontecer na Assembleia Geral. ☐ F ☒ V
- d) Os membros do Conselho Superior são escolhidos durante as eleições para os cargos de Diretoria da SBA. ☒ F ☐ V
- e) A SBA possui três Departamentos: Administrativo, Defesa Profissional e Científico. ☐ F ☒ V

3 - Quanto ao risco profissional do anestesiológista no centro cirúrgico:

- a) No paciente com marca-passo cardíaco implantado, devemos empregar bisturi elétrico monopolar. ☒ F ☐ V
- b) Unidades de aquecimento corpóreo com fluxo de ar forçado produzem e acrescentam níveis de ruído ao ambiente cirúrgico acima de 84 dB. ☐ F ☒ V
- c) A maior taxa de morte relacionada com a dependência química entre os médicos ocorre entre 10 e 20 anos após o término da residência médica. ☒ F ☐ V
- d) A dose máxima de radiação permitida pela Comissão Internacional de Proteção Radiológica, corresponde a 100mrem/semana e 5rem/ano. ☐ F ☒ V
- e) O material de blindagem deve ter espessura de, no mínimo, 0,5 mm de chumbo ou equivalente, para oferecer um poder de 90 % de proteção contra a radiação dispersa no ambiente. ☐ F ☒ V

4 - Com relação a avaliação pré-anestésica:

- a) O risco de morte por complicações cardíacas e Infarto do Miocárdio nos primeiros 30 dias é considerado intermediário em endarterectomia de carótida e transplante pulmonar. ☒ F ☐ V
- b) O Termo de Consentimento Informado deve incluir o esclarecimento dos procedimentos que se pretende realizar, seus benefícios e riscos, de forma clara e acessível à compreensão do paciente. ☐ F ☒ V
- c) Indivíduos com Equivalente metabólico (METs) menor ou igual a 4 tem baixa capacidade funcional. ☐ F ☒ V
- d) A classificação de Mallampati III e a ausência de dentes são fatores de previsibilidade de intubação difícil. ☒ F ☐ V
- e) A apneia do sono é considerada sinal de alerta para dificuldade de ventilação. ☐ F ☒ V

5 – Homem de 46 anos, 118 Kg e 160 cm, possui barba volumosa e apresenta apneia obstrutiva do sono. Será submetido à colecistectomia videolaparoscópica . Que outros pontos de dificuldade devem ser avaliados para a definição da abordagem da via aérea desse paciente, utilizando o sistema de classificação de Mallampati.

- a) A fonação aumenta a especificidade do teste de Mallampati. ☐ F ☒ V
- b) A visualização do palato mole, fauces e pilares define um escore de ☐ F ☒ V Mallampati II.
- c) A capacidade de visualizar as amígdalas linguais corresponde ao escore ☒ F ☐ V de Mallampati I.
- d) O escore de Mallampati correlaciona-se bem com a dificuldade de ☒ F ☐ V ventilação com máscara.
- e) A classificação de Mallampati IV possui alto valor preditivo positivo de ☒ F ☐ V laringoscopia direta difícil.