

Prova Trimestral - 1º TR - ME 3

1- Sobre os hormônios adrenocorticais:

Questões		Resposta:
A)	a menor parte do cortisol circulante está ligado a globulina ligadora de corticosterona.	Falso
B)	a secreção de glicocorticoide é regulada pelo Fator de Liberação de Corticotrofina, liberado pela hipófise.	Falso
C)	a aldosterona é o principal mineralocorticoide e age nos túbulos renais proximais com reabsorção de sódio e secreção de potássio e hidrogênio.	Falso
D)	o preparo de pacientes com doença de Addison inclui o tratamento da hipervolemia, hipercalemia e hiponatremia.	Falso
E)	destruição autoimune das glândulas adrenais está associada a outros transtornos autoimunes, como diabetes tipo 1 e tireoidite de Hashimoto.	Verdadeiro

2- Com relação ao atendimento anestésico do paciente vítima de trauma:

Questões		Resposta:
A)	idade inferior a 14 anos e suspeita de trauma laríngeo são contraindicações à realização de cricotireoidostomia.	Falso
B)	paciente masculino de 70 Kg com perda sanguínea de 35% é classificado como classe IV pelo Advanced Trauma Life Support (ATLS).	Falso
C)	em pacientes vítimas de choque hemorrágico, a tríade letal consiste na ocorrência de acidose, hipotermia e anemia dilucional.	Falso
D)	uma das metas do tratamento inicial do paciente vítima de traumatismo cranioencefálico (TCE) é manter a pressão intracraniana entre 20 e 25 mmHg.	Verdadeiro
E)	em paciente com queimadura de via aérea, a ocorrência de acidose metabólica pode estar associada a disfunção mitocondrial.	Verdadeiro

3- Retalhos de tecido livre são usados frequentemente em cirurgias plásticas reparadoras de pacientes oncológicos, como para reconstrução mamária ou após remoção de tumores de cabeça e pescoço. Em relação a esses retalhos, julgue:

Questões		Resposta:
A)	Os vasos transplantados nas cirurgias com retalho livre são normalmente desnervados e carecem de tônus simpático.	Verdadeiro
B)	Há consenso que a hemodiluição hipervolêmica é indicada nessas cirurgias para evitar a necessidade de doses de vasopressores.	Falso
C)	Existem muitos benefícios comprovados do uso de dextrans nessas cirurgias, com risco desprezível de efeitos adversos.	Falso
D)	O sistema linfático desses retalhos geralmente leva semanas para se adequar, o que explica a tendência ao edema desses retalhos.	Verdadeiro
E)	O fluxo sanguíneo do retalho depende da pressão arterial sistêmica e da viscosidade sanguínea.	Verdadeiro

4- A respeito da anestesia para procedimentos Bucomaxilofaciais:

Questões		Resposta:
A)	a cirurgia da mandíbula e articulação temporomandibular é realizada por cirurgiões bucomaxilofaciais, otorrinolaringologistas e cirurgiões plásticos.	Verdadeiro
B)	a anestesia hipotensiva é contraindicada em procedimentos ortognáticos.	Falso
C)	a intubação submentoniana está indicada em pacientes com disfunção da articulação temporomandibular.	Falso
D)	a intubação orotraqueal com tubo pré-moldado com conector apontando para os pés do paciente é indicada para cirurgias de articulação temporomandibular.	Falso
E)	a intubação nasal por broncofibroscopia está indicada em pacientes com anquilose da articulação temporomandibular.	Verdadeiro

5- Sobre anestesia para cirurgia e procedimentos torácicos:

Questões		Resposta:
A)	a cirurgia eletiva de ressecção pulmonar é considerada um procedimento de risco intermediário em termos de isquemia cardíaca perioperatória.	Verdadeiro
B)	ressecção pulmonar do lado direito é fator de risco de dessaturação durante a ventilação monopulmonar.	Verdadeiro
C)	aplicar pressão positiva contínua (CPAP) de 5 cm H ₂ O no pulmão ventilado é uma estratégia para tratar uma dessaturação durante a ventilação monopulmonar.	Falso
D)	durante mediastinoscopia é recomendado que o oxímetro de pulso seja posicionado no membro superior esquerdo.	Falso
E)	a lobectomia inferior é indicação relativa de utilização de ventilação monopulmonar.	Verdadeiro