

1- Com relação a anestesia pediátrica.

Questões	Resposta:
A) É necessário tecido muscular arterial para o verdadeiro fechamento do ducto arterial. Este tecido é menos prevalente em prematuros.	Verdadeiro
B) Em lactentes e crianças, estoque cardíacos de cálcio são reduzidos por imaturidade do retículo sarcoplasmático.	Verdadeiro
C) Presença de meningomielocelose torna a possibilidade de hidrocefalia rara.	Falso
D) O bloqueio do nervo zigomático-facial é efetivo para analgesia em cirurgias de correção de lábio leporiano.	Falso
E) Dexametasona está indicada para profilaxia das náuseas e vômitos pós-operatórios em pacientes submetidos à amigdalectomia secundária ao linfoma.	Falso

2- Sobre anestesia para transplante:

Questões	Resposta:
A) A hipertensão pulmonar grave e irreversível é uma indicação para transplante cardíaco devido à insuficiência do ventrículo direito.	Falso
B) Na fase de reperfusão no transplante hepático, o despinçamento das artérias hepáticas é geralmente hemodinamicamente sem complicações.	Verdadeiro
C) A maioria dos transplantes de pâncreas (cerca de 75%) são feitos simultaneamente com transplantes renais de um único doador falecido.	Verdadeiro
D) O transplante de fígado é tradicionalmente descrito em fases: dissecação ou hepatectomia, fase anepática e fase neo-hepática, com reperfusão de enxerto marcando o início da fase neo-hepática.	Verdadeiro
E) Receptores de transplantes pulmonares apresentam volume intravascular diminuído e hipertensão pulmonar crônica, fatores que predisõem os pacientes à hipotensão e aumento do subsídio cardíaco na indução anestésica.	Verdadeiro

3- Mulher de 85 anos portadora de estenose aórtica grave é encaminhada para procedimento de implante de valva aórtica transcaterter (TAVI):

Questões	Resposta:
A) Pacientes indicados para realização de TAVI são geralmente graves e ineleáveis à cirurgia convencional.	Verdadeiro
B) No momento do implante da válvula se faz necessário induzir taquicardia ventricular através do marcapasso previamente instalado.	Verdadeiro
C) A via de acesso anterógrada é a preferencial, deixando a via retrógrada para casos quando há tortuosidade, trombose ou diâmetros vasculares pequenos.	Falso
D) Durante todo o procedimento, manter hipotensão é fundamental para evitar disfunção cardíaca.	Falso
E) O ecotransesofágico mostra em tempo real a função ventricular além de guiar o manejo hemodinâmico.	Verdadeiro

4- Em relação aos analgésicos e adjuvantes não opioides no controle da dor pós-operatória:

Questões	Resposta:
A) O efeito analgésico do Ibuprofeno ocorre principalmente pela inibição da isoenzima COX 1.	Falso
B) O paracetamol em doses terapêuticas é seguro nos pacientes etilistas crônicos.	Falso
C) Na analgesia com a dipirona importantes concentrações dos metabólitos atravessam a barreira hematoencefálica e induzem analgesia por ação central.	Verdadeiro
D) Gabapentina e pregabalina atenuam o fenômeno de tolerância decorrente do uso crônico de opioides.	Verdadeiro
E) A cetamina é um antagonista do receptor NMDA, que previne a sensibilização central ao estímulo algico.	Verdadeiro

5- Com relação às particularidades anestésicas na cirurgia para correção de hérnia diafragmática congênita, deve-se:

Questões	Resposta:
A) avaliar hipertensão pulmonar e outras anomalias congênitas no pré-operatório.	Verdadeiro
B) evitar ventilação antes da intubação.	Verdadeiro
C) puncionar acesso venoso periférico, preferencialmente, nos membros inferiores.	Falso
D) puncionar acesso venoso central, preferencialmente, em veia jugular.	Falso
E) aferir saturação arterial de oxigênio no braço direito, refletindo saturação pré-ductal.	Verdadeiro