

1 - Após uma parada cardiorrespiratória e reanimação:

Questões	Resposta:
A) em pacientes com diagnóstico de obstrução coronariana e instáveis hemodinamicamente, a angiografia deve ser protelada até a estabilização.	Falso
B) deve ser estabelecido controle direcionado de temperatura, com manutenção de hipotermia entre 31 e 32° C por pelo menos 48 horas.	Falso
C) uma angiografia de urgência deve ser a primeira medida a ser adotada.	Falso
D) um eletroencefalograma deve ser prontamente realizado em pacientes que permanecem comatosos.	Verdadeiro
E) hipertermia (febre) deve ser evitada e controlada ativamente.	Verdadeiro

2 - Sobre bloqueios do neuroeixo:

Questões	Resposta:
A) O tônus vascular arterial é comprometido em situações de hipóxia e acidose contribuindo para o colapso cardiovascular após raquianestesia.	Verdadeiro
B) O fluxo sanguíneo hepático se mantém constante após anestesia do neuroeixo em virtude de sua autorregulação.	Falso
C) Nos bloqueios altos do neuroeixo, o volume de reserva expiratório, o pico de fluxo expiratório e a ventilação minuto estão preservados.	Falso
D) Náuseas após bloqueio do neuroeixo são consequentes ao aumento do peristaltismo, bem como da isquemia intestinal induzida pela hipotensão, que produz dopamina e outras substâncias emetogênicas.	Falso
E) Hipoperfusão renal ocorre uma vez que haja hipotensão após bloqueio do neuroeixo, pois não há autorregulação do fluxo sanguíneo renal.	Falso

3 - Com relação às reações de hipersensibilidade:

Questões	Resposta:
A) as quinolonas são os antibióticos que mais frequentemente causam reações alérgicas.	Falso
B) eventos posteriores ao uso de anestésicos locais, tipo aminoamidas, são frequentes.	Falso
C) o uso de propofol está contraindicado nos pacientes com alergia a ovo.	Falso
D) durante a respiração controlada é comum observar redução da complacência pulmonar.	Verdadeiro
E) o quadro final do choque anafilático é um choque hipervolêmico, com hemodiluição, aumento do retorno venoso e débito cardíaco.	Falso

4 - A respeito das complicações da anestesia, julgue:

Questões	Resposta:
A) raquianestesia é fator protetor para hipotermia perioperatória.	Falso
B) náuseas e vômitos pós-operatórios são mais comuns em mulheres jovens.	Verdadeiro
C) a dor aguda pós-operatória é mais comum em pacientes com dor pré-operatória.	Verdadeiro
D) doença do núcleo central é fator de risco para hipertermia maligna.	Verdadeiro
E) há menor risco de complicações cardiovasculares maiores em pacientes submetidos a cirurgias intraperitoneais.	Falso

5 - Sobre a sala de recuperação pós-anestésica (SRPA):

Questões	Resposta:
A) a causa mais comum de obstrução da via aérea é a perda do tônus muscular laríngeo.	Falso
B) laringoespasma é mais comum no interregno entre o estado de anestesia geral e o de totalmente acordado.	Verdadeiro
C) tremores (<i>shivering</i>) é fator predisponente para hipertensão.	Verdadeiro
D) paciente deve apresentar escore de Aldrete 10 para alta da SRPA.	Falso
E) visão embaçada, lacrimejamento, vermelhidão, fotofobia e sensação de corpo estranho caracterizam a complicação oftálmica mais comum no pós-operatório.	Verdadeiro