

1 - Sobre anestesia ambulatorial:

Questões	Resposta:
A) Midazolam é preferido a outros benzodiazepínicos porque é solúvel em água, não causa irritação venosa ou dor à injeção, é de ação rápida e meia-vida de eliminação relativamente curta cerca de 2 a 4 horas.	Verdadeiro
B) Recuperação fast track é quando no pós-operatório paciente passa da fase 1 de recuperação direto para fase 2 sem passar pela sala de recuperação pós-anestésica.	Verdadeiro
C) Bebês a termo cuja idade pós-conceptual é inferior a 46 semanas, ou prematuros bebês cuja idade pós-conceptual é inferior a 60 semanas devem ser monitorados por 12 horas após o procedimento devido ao risco de apneia pós-operatória.	Verdadeiro
D) Miringotomia bilateral e timpanoplastia são cirurgias compatíveis com cuidados pós-operatórios complexos, por isso devem ser evitados no regime ambulatorial.	Falso
E) Idosos acima de 65 anos são contraindicados à cirurgia ambulatorial devido ao risco aumentado de eventos cardiovasculares adversos no intraoperatório.	Falso

2 - Quanto à classificação de *Child-Pugh* para a avaliação da função hepática:

Questões	Resposta:
A) albumina, bilirrubinas e creatinina são critérios utilizados na classificação.	Falso
B) o tipo B apresenta índice de mortalidade em média de 31%.	Verdadeiro
C) albumina entre 2,8 g.dL ⁻¹ e 3,5 g.dL ⁻¹ e bilirrubinas acima de 3 mg. dL ⁻¹ contribuem com 3 pontos cada.	Falso
D) creatinina acima de 3 mg.dL ⁻¹ é um dos critérios para classificação tipo C.	Falso
E) quanto maior o aumento do índice internacional normalizado (INR), mais grave o paciente.	Verdadeiro

3 - Em anestesia para amigdalectomia, observa-se que:

Questões	Resposta:
A) o cetololaco é analgésico seguro no pós-operatório de amigdalectomia em adulto.	Falso
B) salbutamol no pré-operatório é indicado nos pacientes com história de asma.	Verdadeiro
C) a colapsabilidade da via aérea em crianças é frequente na presença de hipertrofia amigdaliana.	Verdadeiro
D) a codeína é o analgésico indicado em crianças submetidas à amigdalectomia por hipertrofia amigdaliana.	Falso
E) a hiperreatividade da via aérea permanece por até 6 semanas após infecção de vias aéreas inferiores.	Verdadeiro

4 - Com relação aos bloqueios oculares:

Questões	Resposta:
A) a associação com adrenalina aumenta a pressão intraocular.	Falso
B) a hialuronidase reduz a latência e duração do anestésico local.	Verdadeiro
C) são contraindicados em pacientes com uso de anticoagulantes.	Falso
D) a acinesia do músculo elevador das pálpebras ocorre pelo bloqueio do nervo oculomotor.	Verdadeiro
E) olhos com diâmetro anteroposterior maior que 25 mm contraindicam bloqueio peribulbar.	Falso

5 - Os procedimentos realizados em regime ambulatorial:

Questões	Resposta:
A) permitem maior controle das náuseas e vômitos pós-operatórios.	Falso
B) prescindem de avaliação pré-anestésica.	Falso
C) têm maior risco de infecção hospitalar.	Falso
D) dificultam a relação médico-paciente.	Falso
E) diminuem o custo hospitalar.	Verdadeiro