

1 - Sobre as síndromes dolorosas crônicas:

Questões	Resposta:
A) A neuralgia do nervo trigêmeo acomete qualquer um de seus ramos, com maior prevalência em V1.	Falso
B) A incidência do herpes zoster é maior em crianças e adultos jovens. Frequentemente há recorrência e não há diferença entre os sexos ou racial na incidência.	Falso
C) A Síndrome Complexa de Dor Regional (SCDR) geralmente ocorre após uma lesão, tem localização predominantemente proximal e são observadas: inflamação, alterações autonômicas, cutâneas, distróficas, mas não motoras.	Falso
D) A incidência de dor fantasma é maior nas amputações distais de membro não dominante.	Falso
E) Uma vez estabelecida a neuropatia diabética dolorosa, a hiperglicemia diminui a intensidade da dor, pois a glicose modula a percepção através de interação com peptídeos opioides endógenos.	Falso

2 - Complicações pulmonares pós-operatórias são uma importante causa de morbimortalidade hospitalar após grandes cirurgias. Com relação às estratégias protetoras de ventilação mecânica intraoperatória:

Questões	Resposta:
A) a presença de sonda nasogástrica é fator de risco para complicações pulmonares pós-operatórias.	Verdadeiro
B) o escore ARISCAT pode ser usado na predição de complicações pulmonares pós-operatórias, sendo composto por cinco variáveis.	Falso
C) histórico de tabagismo é uma das variáveis analisadas pelo escore ARISCAT.	Falso
D) são mecanismos associados ao dano às células endoteliais e barreira alveolocapilar pulmonar: barotrauma, volutrauma e atelectrauma.	Verdadeiro
E) o volume corrente deve ser calculado com base no peso corporal predito do paciente, visando manter a <i>driving pressure</i> abaixo de 15 mmHg.	Verdadeiro

3 - Julgue os seguintes conceitos relacionados ao gerenciamento do centro cirúrgico:

Questões	Resposta:
A) o tempo de giro de sala (<i>turnover</i>) refere-se ao tempo entre a saída de um paciente da sala operatória e o horário de entrada do próximo paciente na mesma sala.	Verdadeiro
B) o tempo de sala operatória é definido como o tempo entre o preparo da sala operatória e a saída do paciente.	Falso
C) a diferença entre o horário planejado de início e de fim de atividades eletivas para a sala operatória nos dias úteis da semana é definido como "tempo alocado de uma sala operatória".	Verdadeiro
D) a carga de utilização de uma sala operatória é a soma das durações dos casos realizados na mesma, incluindo giros de sala.	Verdadeiro
E) o tempo subutilizado de uma sala operatória é a diferença entre o tempo alocado de uma sala operatória e a carga de utilização da mesma sala.	Verdadeiro

4 - Com relação aos princípios norteadores do cuidado centrado no paciente relacionados a qualidade e segurança:

Questões	Resposta:
A) uma definição de segurança é a de que nenhum paciente ou profissional de saúde deve ser lesado pelo sistema de saúde a qualquer momento, inclusive durante as transições entre o cuidado e horários de folga.	Verdadeiro
B) a redução do tempo de espera dos pacientes é muito importante, longas esperas sinalizam falta de respeito com o tempo do paciente. Para os profissionais de saúde as esperas são normais e sua redução secundária em relação ao paciente.	Falso
C) a primeira área de conhecimento profundo de Deming é a apreciação de um sistema. Se um sistema está com baixo desempenho é porque ele foi involuntariamente projetado para ter um desempenho inferior. Se este é o caso, é nossa responsabilidade gerenciar o sistema para obter os resultados que queremos.	Verdadeiro
D) <i>debriefing</i> deve ser realizado antes de cada procedimento; e o <i>briefing</i> , após cada procedimento.	Falso
E) a notificação espontânea ou voluntária de incidentes deve tornar-se menos punitiva e mais focada em sistemas do que em indivíduos.	Verdadeiro

5 - Sobre suporte ventilatório:

Questões	Resposta:
A) o ventilador de pistão tem a vantagem de ter o potencial para fornecimento de volume corrente muito preciso, devido à baixa complacência da câmara do pistão	Verdadeiro
B) a ventilação com pressão positiva aumenta pressão da veia cava inferior, aumentando a pressão capilar peritubular renal reduzindo a reabsorção tubular de sódio.	Falso
C) há diferença na depuração de creatinina e na excreção fracionada de sódio entre os modos ventilatórios volume controlado e ventilação com pressão de suporte.	Falso
D) na fase expiratória do ventilador de pistão, o fluxo de gás fresco mais o gás exalado do balão respiratório reabastecem a câmara do pistão.	Verdadeiro
E) na ventilação protetora pulmonar utiliza-se 6 mL/kg de peso corporal predito com pressões de platô inferiores a 30 cmH ₂ O.	Verdadeiro