

Prova Trimestral - 1º TR - ME 3
Alteração de gabarito em vermelho

1- Paciente de 25 anos, feminino, IMC 28kg/m², entrou para o centro cirúrgico para realização de apendicectomia videolaparoscópica de urgência. Relata que estava em investigação para quadro de fadiga e sonolência intensa e ganho ponderal. Apresentou exame laboratorial recente dentro da normalidade, com exceção de TSH de 15mUI/L. A respeito desse caso, responda os itens abaixo com verdadeiro ou falso.

Questões		Resposta:
A)	A cirurgia deve ser suspensa até o controle do quadro.	Falso
B)	O uso de glicocorticoides em altas doses pode piorar o quadro clínico.	Verdadeiro
C)	O tratamento com reposição de hormônios tireoidianos deve ser iniciado assim que possível.	Verdadeiro
D)	Deve ser realizada tromboprofilaxia medicamentosa pelo maior risco de eventos tromboembólicos.	ANULADA
E)	Deve-se ter cuidado com uso de opioides no manejo anestésico e pós-cirúrgico, uma vez que a paciente pode ter aumento da sensibilidade a esses fármacos.	Verdadeiro

2- São critérios vermelhos de alto risco de gravidade em lesões traumáticas em adultos, segundo o *National guideline for the field triage of trauma patients* americano?

Questões		Resposta:
A)	Fratura suspeita de um osso longo proximal.	Falso
B)	Desenlucamento de pé.	Verdadeiro
C)	Inabilidade de obedecer a comandos.	Verdadeiro
D)	Frequência cardíaca > Pressão arterial sistólica.	Verdadeiro
E)	Uso contínuo de anticoagulantes previamente pela vítima.	Falso

3- Homem, 48 anos, 70 kg, 170cm, deu entrada no centro cirúrgico com extensas queimaduras face, pescoço e tórax há 72 h, será submetido a desbridamento e curativo das queimaduras, apresentou aproximadamente 50% de superfície corporal queimada. Segue a figura, após a indução anestésica. Sobre anestesia para cirurgia plástica no paciente queimado, responda:



Questões		Resposta:
A)	o risco de hiperpotassemia com succinilcolina em pacientes queimados é mínimo após 72 horas da lesão, tornando sua administração segura após esse período.	Falso
B)	durante a fase hiperdinâmica, a eliminação de todos os fármacos é reduzida devido ao aumento da perfusão hepática e renal.	Falso
C)	o volume de distribuição de muitos fármacos, como propofol e fentanil, aumenta em pacientes queimados devido à diminuição da albumina e a expansão do volume extravascular.	Verdadeiro
D)	o aumento da glicoproteína ácida α_1 na queimadura resulta em maior disponibilidade de fármacos catiônicos na circulação, aumentando seus efeitos.	Falso
E)	o tipo de alteração da via aérea pode variar de acordo com o estágio da queimadura: na fase aguda, o edema pode limitar a mobilidade da mandíbula e a abertura da boca. Na fase tardia, podem surgir contraturas que restringem a movimentação do pescoço e dificultam a ventilação.	Verdadeiro

4- No que se refere a anestesia para cirurgias bucomaxilofaciais, analise as assertivas abaixo:

Questões		Resposta:
A)	em avulsões (exarticulações) dentárias, durante a anestesia, o reimplante não deve ser procedido durante o mesmo ato anestésico, pois existe o risco de piorado prognóstico.	Falso
B)	na presença de hiper mobilidade mandibular, pode ocorrer luxação da articulação temporomandibular durante as manobras de intubação, cujo manejo deve ser imediato, por meio da redução manual.	Verdadeiro
C)	pacientes em tratamento de doenças do metabolismo ósseo e oncológicas deverão informar o uso de medicamentos contendo bisfosfonatos, devido à osteonecrose dos maxilares, associada ao uso destes fármacos.	Verdadeiro
D)	as síndromes como Crouzon e Appert, Freeman-Sheldon e Down sinalizam importantes limitações mecânicas e funcionais do sistema estomatognático e do pescoço.	Verdadeiro
E)	a face é dotada de uma rede vascular ampla, a maioria dos vasos cruzam a linha média para formar anastomoses contralaterais, fazendo com que a hemostasia unilateral possa não coibir sangramentos.	Verdadeiro

5- De acordo com as zonas de West, na posição ereta, considerando que PA = pressão alveolar; P_{pa} = pressão da artéria pulmonar; e P_{pv} =pressão na veia pulmonar:

Questões		Resposta:
A)	zona 1 = $PA > P_{pa} = P_{pv}$	Falso
B)	zona 1 = $PA < P_{pa} = P_{pv}$	Falso
C)	zona 1 = $PA > P_{pa} > P_{pv}$	Verdadeiro
D)	zona 2 = $P_{pa} > PA > P_{pv}$	Verdadeiro
E)	zona 2 = $P_{pa} < PA > P_{pv}$	Falso