

Prova Trimestral - 3º TR - ME 2**1- Em relação ao fluxo sanguíneo renal é correto afirmar:**

Questões		Resposta:
A)	a autorregulação mantém o fluxo sanguíneo renal e a taxa de filtração glomerular constantes.	Verdadeiro
B)	o intervalo de pressão arterial média de 40 a 60 mmHg mantém a autorregulação.	Falso
C)	o baixo fluxo cortical comparado ao medular torna o córtex mais propenso a isquemia.	Falso
D)	o fluxo sanguíneo renal (ml/100g) é menor comparado ao fluxo no miocárdio.	Falso
E)	o débito cardíaco tem um efeito relevante no fluxo sanguíneo renal e filtração glomerular.	Verdadeiro

2- Paciente com Doença Renal Crônica (DRC) estágio 5 em hemodiálise será submetido confecção de fístula arteriovenosa. Analise as considerações perioperatórias:

Questões		Resposta:
A)	disfunção plaquetária pode agravar perda sanguínea mas responde à diálise, crioprecipitado e acetato de desmopressina	Verdadeiro
B)	edema pulmonar e disfunção pulmonar restritiva, frequentemente observados, são responsivos à diálise	Verdadeiro
C)	a hiperventilação em pacientes com DRC resulta de acidose metabólica crônica bem como do aumento da água pulmonar e da complacência pulmonar reduzida	Verdadeiro
D)	em pacientes urêmicos, a ligação proteica de drogas ácidas está reduzida enquanto agentes básicos têm ligação aumentada	Verdadeiro
E)	morfina em administração crônica resulta em acúmulo do metabólito 6-glicoronídeo com potentes efeitos analgésicos e sedativos	Verdadeiro

3- A gravidez resulta em alterações significativas em vias aéreas superiores, volumes pulmonares, ventilação, consumo de O₂ e taxa metabólica. Sobre as alterações fisiológicas respiratórias da gestação:

Questões		Resposta:
A)	Congestão capilar com aumento da friabilidade tecidual e edema da mucosa da orofaringe, laringe e traqueia ocorre apenas a partir do terceiro trimestre.	Falso
B)	O aumento da ventilação minuto é alcançado principalmente como resultado de um aumento da frequência respiratória.	Falso
C)	Durante a gestação, a curva de dissociação da oxiemoglobina materna se desloca para a direita, enquanto a curva de dissociação da oxiemoglobina fetal se encontra à esquerda.	Verdadeiro
D)	Durante a gestação ocorre uma redução da capacidade de oclusão e da capacidade vital.	Falso
E)	A saturação de O ₂ fetal não excede 60%, mesmo com a administração de O ₂ a 100% à gestante.	Verdadeiro

4- Sobre anestesia em obstetrícia.

Questões		Resposta:
A)	Níveis de fosfatase alcalina mais que dobram, devido à colestase fisiológica da gravidez.	Falso
B)	Morfina e meperidina têm metabólito ativo com meia-vida mais longa em neonatos do que em adultos	Verdadeiro
C)	Em cesarianas, quando a morfina neuroaxial é usada, o bloqueio TAP não apresenta diferença no controle da dor pós-operatória.	Verdadeiro
D)	A atividade da colinesterase plasmática (pseudocolinesterase) aumenta aproximadamente 25% a 30% a partir da 10ª semana de gestação e dura até 6 semanas pós-parto.	Falso
E)	O tônus muscular uterino não é afetado pelos relaxantes musculares esqueléticos e, em doses padrão, todas as classes de relaxantes musculares são pobremente transferidas para o feto.	Verdadeiro

5- Sobre anestesia para cirurgia ortopédica:

Questões		Resposta:
A)	a maioria das cirurgias ortopédicas é classificada como risco cirúrgico intermediário, com eventos cardíacos ocorrendo em 10% a 15% dos pacientes.	Falso
B)	a redução da exposição a anestésicos gerais pode ajudar a prevenir delirium, mas não há evidências conclusivas de que a anestesia raquidiana seja superior à anestesia geral na redução do delirium.	Verdadeiro
C)	nas artroplastias são fatores de risco independentes para tromboembolismo venoso (TEV): doenças cardiovasculares, histórico de TEV, doenças neurológicas e pontuação ASA.	Verdadeiro
D)	na artroplastia de quadril o uso de próteses cimentadas deve ser considerado em pacientes de alto risco para embolia, visando reduzir complicações hemodinâmicas.	Falso
E)	perda visual perioperatória é uma complicação rara, mas devastadora, associada a cirurgias de coluna. Fatores de risco incluem: sexo feminino, pacientes com IMC (índice de massa corpórea) abaixo de 26 e uso de suporte de Wilson.	Falso