

Prova Trimestral - 3º TR - ME 3 (CORRIGIDO)**1- Sobre anestesia no paciente pediátrico:**

Questões		Resposta:
A)	prematuridade e idade gestacional menor que 60 semanas são fortes fatores de risco para apneia pós-operatória em bebês.	ANULADA
B)	a cafeína é o tratamento de primeira escolha para apneia da prematuridade, com taquicardia relatada em doses mais altas.	Verdadeiro
C)	laringoespasma é o fechamento reflexo das cordas vocais falsas e verdadeiras, resultando em obstrução completa das vias aéreas.	Verdadeiro
D)	o delírio ao despertar da anestesia é mais comum na população pediátrica, com uma incidência relatada de até 80%.	Verdadeiro
E)	o delírio ao despertar geralmente se manifesta como um período de agitação ou, raramente, um período de hipoatividade nos primeiros 30 minutos após o despertar da anestesia geral	Verdadeiro

2- Na anestesia para transplantes quais os objetivos para manutenção do potencial doador?

Questões		Resposta:
A)	Glicemia <180 mg/dL.	ANULADA
B)	Hemoglobina > 10 mg/dL.	ANULADA
C)	Dosagem final de sódio ≤ 155 mmol/L.	ANULADA
D)	Pressão parcial de oxigênio $\text{PaO}_2 \geq 300$ mmHg.	Verdadeiro
E)	Pressão arterial média ≥ 100 mmHg.	Falso


3- Homem de 52 anos, com IMC 38 kg/m², antecedente de apneia obstrutiva do sono e refluxo gastroesofágico, será submetido a esofagogastroduodenoscopia (EGD) com previsão de mucosectomia gástrica. O exame será realizado fora do centro cirúrgico, com uso de bisturi elétrico. Com base no quadro clínico, avalie as alternativas:

Questões		Resposta:
A)	em pacientes com apneia do sono e risco de aspiração, a anestesia geral pode ser preferível à sedação com benzodiazepínicos e opioides.	Verdadeiro
B)	o uso de bisturi elétrico na endoscopia alta exige precauções contra incêndio de via aérea.	Verdadeiro
C)	o propofol em dose única é suficiente para garantir sedação adequada durante toda a mucosectomia.	Falso
D)	perfuração gastrointestinal é uma complicação potencial e pode requerer intervenção cirúrgica imediata.	Verdadeiro
E)	o índice biespectral (BIS) médio de 59 durante esofagogastroduodenoscopia indica sedação leve e segura, sem risco de depressão respiratória.	Falso

4- Sobre o mecanismo da dor no pós-operatório:

Questões	Resposta:
A) é o resultado apenas da ativação dos nociceptores periféricos.	Falso
B) as fibras A delta mielinizadas conduzem dor aguda e bem localizada.	Verdadeiro
C) a percepção da dor envolve tanto o córtex somatossensorial quanto áreas do sistema límbico, como o córtex cingulado e a ínsula.	Verdadeiro
D) a estimulação repetitiva de fibras C, pode levar ao fenômeno de wind-up, um tipo de plasticidade sináptica que causa sensibilização central.	Verdadeiro
E) a analgesia multimodal atua em todos os estágios do processamento da dor: transdução, transmissão, modulação e percepção.	Verdadeiro

5- Você foi escalado para anestésias uma paciente de 80 anos, que será submetida a uma colecistectomia videolaparoscópica, seu *staff* apresenta um gráfico e orienta a levar em consideração as alterações ali apresentadas quando for realizar a ventilação mecânica. Diante disso, com o envelhecimento, podemos afirmar que:



Questões	Resposta:
A) ocorre uma redução importante da capacidade pulmonar total.	Falso
B) a capacidade de fechamento pode exceder a capacidade residual funcional, levando a atelectasias.	Verdadeiro
C) ocorre aumento da complacência pulmonar e redução da complacência da parede torácica.	Verdadeiro
D) a soma do volume de reserva expiratória com o volume residual reflete a capacidade vital.	Falso
E) a diminuição da rigidez do tecido pulmonar se deve à perda de fibrina com a idade.	Falso